

1. års engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 10, 2018

- MCPA, både før og efter kløverhøst
- Zypar til bortsprøjtning af kløver i engrapgræs
- Hussar mod kløver og enårig rapgræs
- Snegle

Bortsprøjtning af hvidkløver forud for engrapgræs

I de hvidkløvermarker, hvor der er udlagt frøgræs til høst 2019, skal kløvergenvæksten sprøjtes væk, så snart kløveren er i vækst, efter vi nu har fået nedbøren i den forgangne uge.

Zypar er godkendt til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs med 1 l/ha eller to gange 0,5 l/ha i august måned.

MCPA er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs til bortsprøjtning af kløver i en dosis på 1,0 l pr. ha. Tjek på [Middeldatabasen](#) hvilke handelspræparater af MCPA, der er godkendt. Anvendelse må ske frem til den 1. september, og midlerne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. MCPA anvendt til nedvisning før kløverhøst tæller med til sæsonen 2017/18.

En behandling til bortsprøjtning af hvidkløver er ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor skal der udføres en supplerende behandling i efteråret med 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. Bemærk, at Express og Hussar ikke må bruges i

samme afgrøde, og Express er derfor ikke interessant.

Anbefaling til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs: 1 l Zypar eller 1,0 l MCPA pr. ha senest 31. august, efterfulgt 10-14 dage senere af 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. Der tilsættes 0,5 l Renol pr. ha. Hussar må senest anvendes den 15. september.

MCPA behandlingen vil også have en sideeffekt mod agertidsler, når disse er i god vækst.

Hussar vil foruden effekten på genvækst og nyfremspiret kløver også have effekt på småt enårig rapgræs.

Snegle

Den seneste nedbør sætter gang i både genvækst og snegle. Vi ser hvert år eksempler på marker, der bliver skadet af snegle, så vær opmærksom på raspede, trevlede blade og sæt ind med bekæmpelsesforanstaltninger så tidligt som muligt. Mod snegle kan der anvendes sneglekorn, som Ferramol/Sluxx. Hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage, skal der genbehandles. Det er den tidlige/første behandling, der sikrer at engrapgræsset får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af måger m.m. inden sneglene får muligheden for at indtage måltidet.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF