

Efter-høst opgaver i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 9, 2018

- **Afpudsning af stub**
- **Enårig- og alm. rapgræs, skadedyr, snegle, rust og starthjælp til svage udlæg**

Nu, da vi har fået den længe ventede nedbør er det tid til at få afpudset alle stubrester i de afhøstede frømarker til en stubhøjde på 3-5 cm af. Marker der er skårlagt med BCS vil allerede have denne stubhøjde. Skiveslåmaskinen er velegnet til afpudsning, men husk at knivene skal være skarpe.

I 1. års marker skal dæksædsstubben afpudses til en stubhøjde på 5-6 cm. I praksis skal kornstubben mørne lidt før en slaglepudser kan slå stubben af. Marker i god vækst afpudses igen ca. 1. september og 1. oktober til en højde på 6-8 cm. I frodige efterår vil sidste afpudsning i ældre marker være optimal midt i oktober. Engrapgræsbladene må ikke "hænge" ved indgangen til vinteren.

Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs

Bekæmpelse af nyfremspiret enårig- og alm. rapgræs kan ske med Boxer og/eller Stomp CS. Et billigere alternativ er 0,1 l DFF pr. ha på fugtig jord så snart de nyfremspiringen starter. På enårig- og alm. rapgræs virker DFF kun som jordmiddel, så jorden må ikke være dækket af afklippet plantemateriale, når der behandles. 0,02 l Hussar OD + 0,5 l olie eller 0,05 l Hussar Plus OD + olie pr. ha har effekt på etableret enårig rapgræs og små planter alm. rapgræs. Hussar skal anvendes senest 15. september.

Agil

Agil kan anvendes mod spildkorn og græsukrudt med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst af dæksæd. Tilsæt max. 0,1 l Lissapol/ha så snart spildkorn, rævehale og hejre er fremspiret. Ved 18°C bør der max. bruges 0,08 l Agil pr ha. Ved 12°C kan der anvendes op til 0,12 l Agil pr. ha. Undgå at bruge Agil ved udsigt til over 20°C.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Skadedyr

Fritfluer i nyudlæg og galmyg i gamle marker flyver i de kommende uger. Sæt fangbakker ud og følg med i flyvningerne. Ved væsentlige forekomster behandles med et pyrethroid i forhold til konstateret flyvning.

Snegle

Snegle har vi ikke set noget til i de seneste måneder, men nedbør vil sikkert få dem frem igen. Snegleproblemet kan være massivt, specielt efter hvidkløver eller efter raps, så hold godt øje med udlæggene og behandl om nødvendigt med sneglekorn. En tidlig behandling sikrer, at engrapgræsset får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af fugle først.

Rust

Engrapgræs med N-mangel bliver let angrebet af rust, hvis ikke de har god kvælstofforsyning. Svage udlægsmarker kan hjælpes i gang med Folicur Xpert og den nye Folicur EW 250 er godkendt til mindre anvendelse mod rust om efteråret. Brug 0,15 - 0,3 l Folicur EW 250 pr. ha.

Gødskning

Selv om sommerens tørke har kostet mange udlægsmarker livet har nogle overlevet. Tilfør 25 - 40 kg N pr. ha snarest så de små planter kan komme i groning. Engrapgræs skal producere underjordiske udløbere i efteråret, for at planterne danner frøstængler næste forår. Kraftige udlægsmarker tilføres kvælstof til midt i september, 45-60 kg N pr. ha. i 1. års marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt i ærter, korn og til flerårsmarker. Engrapgræs udlagt i vintersæd, splitgødskes med to gange 40 N pr. ha.

Gødningsnormen til engrapgræs høst 2019 er for Balin, Chester, Oxford, Lato 160 kg N og for andre sorter 170 kg N pr. ha