

11. september 2018

Udlæg af engrapgræs efterår

FrøavlsINFO nr. 12, 2018

- De småfrøede arter kræver et fint og lunt såbed
- Så i en jævn mark
- Såning af udlæg og korn på hver 2. tragt giver det sikreste resultat

Udlæg af engrapgræs lykkes bedst på muldede lerjorde. Rå lerjord kan være en stor udfordring. Et perfekt såbed er vigtig for at sikre en ensartet jordfugtighed, så fremspiringen kan blive optimal.

Udsædsmængden er normalt 6-8 kg pr. ha.

Frøet placeres i fugtig jord i en sådybde på 1-2 cm, så udlægget spirer frem i samme tempo som dæksæden. Løs jord kan eventuelt tromles inden såning af frøet. Hvis man sår i en tør periode, og der ikke er trykruller på såmaskinen, bør marken tromles efter såning, så jordens kapillareffekt sikrer fugtighed til frøet. To gange tromling kan være farligt.

På udsatte steder, f.eks. lerknolde og lignende steder, kan man evt. så udlæg en ekstra gang.

Valg af dæksæd

Vinterbyg skygger meget, men hvis man bruger dobbelt rækkeafstand er vinterbyg egnet ved såning fra 15. - 25. september.

Hvede kan anvendes som dæksæd for engrapgræs. Lægger man ud i brødhvede, skal kornet normalt sås på alm. rækkeafstand, da sengødskniven i brødhveden ellers sender engrapgræsset for højt op i hveden. Udsædsmængden i hvede kan reduceres med ca. 10 pct. Det er især vigtigt ved udlæg af de lave plænetyper. Ved udlæg i foderhvede bør man vælge dobbelt rækkeafstand, især ved udlæg af lave plænetyper.

Rækkeafstand og sådstyr

Der findes mange gode løsninger til at så engrapgræs på forskellig rækkeafstand. Den bedste chance for succes opnås når dæksæd sås på 24 eller 30 cm's rækkeafstand, og engrapgræsset samtidigt sås midt mellem de to kornrækker.

Frøskassens sårør kan fastgøres til de bagerste trakte på såmaskinen. Hvis der sås direkte ned gennem sårøret, skal man være opmærksom på, at styre sådybden til de ovennævnte 1-2 cm. Er der tale om en Rapid kan man evt. kipe maskinen lidt fremover.

Man kan også køre over arealet to gange. Ved første såning sås kornet på dobbelt rækkeafstand og derefter sås engrapgræs, gerne med alle trakte, på sned af kornets såretning.

Tilstræb at så udlægget samtidigt eller samme dag som dæksæden.

Såtidspunkt

Engrapgræs kræver højere jordtemperatur end korn for at kunne spire.

Ved sen såning er der derfor risiko for, at konkurrencen fra dæksæden bliver stor, og desuden favoriseres enårig rapgræs, der spirer ved endnu lavere temperaturer end korn.

På den anden side bliver eventuelle græsukrudsproblemer væsentlig større jo tidligere man sår vintersæd i efteråret. Vi råder til, at udlægsmarken sås, når jorden stadig er lun ca. den 20. september.

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd

Express SX kunne være et oplagt valg, men dermed blokeres for den vigtige Hussar-sprøjtning til foråret.

Her i efteråret kan der anvendes 0,3 l Buctril + 0,03 l DFF pr. ha, når hveden har to blade og ukrudtet max. 1-2 løvblade.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF