

Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver, rødkløver, alsike humlesneglebælg, kællingetand og lucerne

FrøavlsINFO nr. 7, 2018

- Kerb og Reglone er aktuel i de overvintrende bælgplanter
- Frost efter behandling øger effekten af Reglone
- Vær klar til at rykke ud i december

Afvent behandling med Reglone mod ukrudt til begyndelsen af december.

Behandling i november giver normalt for dårlig effekt af Reglone-behandlingen, hvis der kommer en lun periode efterfølgende. Derimod vil det være rigtig fint at få behandlet de overvintrende bælgplante-afgrøder uden udlæg af frøgræs med Kerb nu, hvor jordtemperaturen er faldet. Effekten på væselhale og andet græsukrudt er bedst inden nytår. I lucerne og humlesneglebælg er kun Kerb 400 SC godkendt til vinterbehandling.

Kerb 400 SC

Kerb 400 SC er godkendt til de bælgseedsarter, der er nævnt i overskriften.

Kerb giver gode muligheder for at få bekæmpet græsukrudt, bl.a. agerrævehale, enårig rapgræs, flyvehavre, rajgræs, andre rapgræsser, vindaks og væselhale. Kerb har også nogen effekt på fuglegræs. Kerb er en god resistensbryder i forhold til andre græsukrudtsmidler.

Virkningen er bedst ved god jordfugtighed og ved lav jordtemperatur under 10°C. Kerb kan evt. udbringes på let frossen jord. Kerb har systemisk effekt og optages gennem rødderne.

Doseringen er 1,0 l pr. ha.

Reglone i hvidkløver og rødkløver

Reglone kan anvendes i perioden december -

februar, men behandling skal ske ved først givne lejlighed fra begyndelsen af december. Der anvendes op til 2,0 l Reglone pr. ha med tilsætning af 0,1 l Lissapol pr. 100 liter vand.

I hvidkløver og rødkløver bekæmpes de fleste ukrudtsarter, men der er særlig god effekt på fuglegræs, agerstedmoder, ærenpris, mindre kamilleplanter samt spildkorn.

Reglone er endvidere godkendt til mindre anvendelse i alsike og kællingetand, og anvendelsen kan ske som beskrevet for hvidkløver og rødkløver.

Virkningsbetingelser for Reglone

Den bedste effekt af Reglone opnås ved sprøjtning om formiddagen i klart solrigt vejr, gerne med en efterfølgende frostperiode. Reglone er et kontaktmiddel, så anvend en relativ stor vandmængde. Jo større plantemasse jo mere vand, mindst 250-400 l vand pr. ha. Ved meget dug nedsættes vandmængden, så sprøjtevæsken ikke løber af bladene. Meget rim på bladene vil nedsætte effekten.

Reglone er hurtig regnfast. Svidningseffekten indtræffer 10 minutter efter behandlingen.

Er det svagt frostvejr på behandlingstidspunktet kan der tilsættes 10 - 12% flydende gødning til sprøjtevæsken for at undgå is i dyserne. I så fald undlades sprede/klæbe middel.

Der findes en række kopiprodukter til Reglone. Ikke alle disse produkter har anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i kløver beskrevet på etiketten. Kontroller derfor, at etiketteteksten er i overensstemmelse med behovet i din mark.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF