

## Ukrudtsbekæmpelse i hybridrajgræs udlagt i renbestand

FrøavlsINFO nr. 8, 2018

- DFF, Boxer og Stomp mod andre græsser
- Pas på spildfrø i sædskiftet

Der vil altid komme en kraftig fremspiring af ukrudt samtidig med græssets fremspiring.

I rajgræs udlagt i renbestand er det vigtigt at få bekæmpet ukrudtet, mens det er småt. Express SX kan anvendes med op til 7,5 gram pr. ha når græsset har 2-4 blade. Express har bred effekt på mange ukrudtsarter, som f.eks. fuglegræs og kamille. Express kan evt. kombineres med 0,05 - 0,1 liter DFF pr. ha.

For at få effekt mod enårig rapgræs anvendes minimum 0,1 l DFF pr. ha udsprøjtet under gode fugtighedsforhold. DFF er godkendt med en mindre anvendelse til nyudlagt frøgræs.

Boxer og Stomp er godkendt til mindre anvendelse i efterårsudlagt ital. rajgræs med 0,5-1,0 liter Boxer EC pr. ha eller 1,2 liter Stomp/Activus 40WG pr. ha. Den største dosis anvendes ved stor forekomst af græsukrudt på lerjorde. Der sprøjtes straks efter såning, og indtil rajgræsset har to blade.

Frøet skal placeres i 2 cm's dybde og være dækket af jord for at mindske risiko for skade. Den bedste effekt på ukrudt opnår man i fremspiringsfasen mens ukrudtsplanterne er små, og hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten, men under sådanne forhold er der også størst risiko for skade på afgrøden. Du kan finde midlernes godkendelser til mindre anvendelse i [Middeldatabasen](#). En

blanding af 0,1 l DFF ha og 0,5 l Boxer pr. ha er en god løsning mod vindaks. Ved kraftig forekomst af enårig rapgræs kan virkningen af DFF forstærkes ved tilsætning af 0,5-1,0 l Stomp pr. ha.

Græsmidlerne kan under uheldige omstændigheder skade afgrøden. Boxer er her den værste, mens risikoen er mindre ved anvendelse af Stomp, og meget lille ved anvendelse af DFF. Det er især store nedbørsmængder efter sprøjtning, der kan forårsage skade.

Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at følge op med et bredspektret ukrudtsmiddel til foråret.

### Efterårsbehandling af udlæg i vårsæd

Lang stub efter tærskning af dæksæden skal pudses ned efter høst, og det er ligeledes en god ide at pudse af i begyndelsen af oktober, hvis der har været god vækst i afgrøden.

### Spildfrø i korn efter rajgræshøst

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe spildfrø i efteråret såvel som i foråret. Sørg for at få så mange spildfrø til at spire samt gå til grunde, inden de pløjes ned. Dette gøres ved at lade marken ligge så længe som muligt, inden jordbehandling. Hvis den først skal sås til foråret, vil det være en god ide at undgå, at der dannes nye stængler med spiredygtigt frø. Derfor anbefales det at afpudse eller nedvisne, inden der er spiredygtige frø i aksene.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF