

Kvælstofnormer til markfrø høst 2019

AUGUST 2018

Kilde: Landbrugsstyrelsen

[Vejledning om gødsknings- og harmoniregler planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019](#)

Frøart	Oprindelig N-norm	Vejledende N-mængder		Ny N-norm
	2017/2018	Efterår	Forår	2018/2019
	Kg / ha			
Alm. rajgræs	170	0-40	140-170	170
Alm. rajgræs efterårsudlagt, 1. års	200	0-40	140-170	200
Italiensk rajgræs	125	0-40	90-120	125
Italiensk rajgræs efterårsudl. 1. års	155	0-40	90-120	155
Hybrid rajgræs	140	0-40	110-140	140
Hybrid rajgræs, efterårsudl. 1. års	170	0-40	110-140	170
Westerwoldisk rajgræs	125	0	90-120	125
Timote og knoldrottehale	110	0-30	30-110	110
Hundegræs	200	50-60	120-130	200
Engsvingel	120	30-40	60-80	120
Bakkesvingel	150	60-80	50-70	150
Rødsvingel lange udl.	150	60-80	50-70	150
Korte og uden udløbere	150	60-80	50-70	150
Rajsvingel, festulolium	160	0-40	130-160	160
Rajsvingel efterårsudlagt	190	0-40	130-160	190
Strandsvingel	200	60-80	100-130	200
Krybhvene og alm. hvene	120	45-60	50-60	120
Alm. rapgræs	130	30	70-100	120
Engrapgræs marktype	160	60-80	70-85	160
Engrapgræs plænetype	170	60-80	75-90	170
Engrapgræs efter kløver	160/170	60-80	60-85	160/170

N-normerne til græsfrø til høst 2019 er uændrede, dog er alm. rapgræs reduceret med 10 kg N pr. ha i forhold til 2017/18.

Venlig hilsen
 Avlsafdelingen
 DLF