

Ukrudt og skadedyr i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 10, 2018

- Ukrudts- og spildkornsbekæmpelse i frømarken
- Ukrudtsbekæmpelse i udlægsmarken
- Skadedyr

Det er ofte nødvendigt at bekæmpe spidkorn i 1. års afgrøder efter korn for at undgå, at spildkornsplanterne hæmmer udlægget.

Spildkorn bekæmpes bedst, mens det er småt, men ved for tidlig behandling risikerer man yderligere fremspiring. Vårbyg er lettest og rug er sværest at bekæmpe. Spildkorn og ukrudtsgræs, bortset fra enårig rapgræs og væselhale, bekæmpes med op til 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash eller 0,6 l Agil pr. ha. Skal der kun bekæmpes spildkorn, rækker 0,4 l Agil pr. ha. Doseringerne kan reduceres, hvis spildkornet har højst tre blade.

Focus Ultra må kun bruges én gang pr. vækstsæson. Der for vil Agil efterår og Focus Ultra forår ofte være en god kombination.

Agerrævehale og rajgræs bekæmpes allerede i efteråret med 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha. **Marker med agerrævehale, der er resistent over for Focus Ultra, skal opløjes.**

Enårig rapgræs kan hæmmes med 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD. Til Hussar produkterne tilsættes 0,5 l olie pr. ha. Produkterne må bruges frem til 15. september. En opfølgende behandling med Hussar om foråret mod enårig rapgræs kan være aktuel i 1. års marker.

Tokimbladet ukrudt i frømarken

Express, Nuance og DFF er godkendt til efterårsbrug i frøgræs med Express SX/Trimmer 50 SG 7,5 g eller Nuance 5 g pr. ha + spredklæbemiddel mod specielt kamille, kornvalmuer og fuglegræs. Midlerne må ikke anvendes efter 30. september.

Venlig hilsen
DLF
Avlsafdelingen

Der må ikke anvendes Hussar til foråret, hvis der er brugt Express/Trimmer/Nuance i efteråret.

Mod agerstedmoder, tvetand og ærenpris er 0,025 - 0,070 l/ha DFF en god løsning. Højeste dosering ved stort ukrudt.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med udlæg

Det er vigtigt at få bekæmpet ukrudtet effektivt i dæksæden. En god løsning er 0,5 l Bucril pr. ha på kornets stadie 12-16. Virkningen forstærkes ved tilsætning af 0,03 l DFF pr. ha. Mod enårig rapgræs skal DFF doseringen øges til 0,1 l pr. ha i marker, hvor rødsvinglen er sået i to cm's dybde. Men behandlingen skal vente, til rødsvinglen er fremspiret, og der må ikke være udsigt til større nedbørsmængder, for at undgå skade på rødsvingel planterne.

Betydende forekomst af enårig rapgræs kan med fordel bekæmpes i udlægsmarken, da konkurrencetrykket er stort fra denne art. Enårig rapgræs kan medføre en væsentlig udbyttenedgang og et større rensesvind.

I hvede med udlæg kan agerrævehale og vindaks bekæmpes med 0,4 l Primera Super/Foxtrot eller 0,2 l Topik pr. ha på afgrødens 3-4 bladstadie.

Skadedyr

I ældre marker af rødsvingel kan insektlarver i stort antal beskadige planterne. Larver af græsmøl og løvsnudebiller gnaver på rødderne og forårsager, at græsset i pletter mistrives og går ud. Ved kraftig angreb af græsmøl bør arealet opløjes og efterfølges af en bredbladet afgrøde til foråret. Er løvsnudebillerne problemet kan man så vintersæd sent efter 1. oktober med et godt resultat.

Både i 2014 og 2016 så vi kraftige angreb af aksløberens larve i rødsvingel. Mod denne skadevolder kan anvendes [Avaunt](#) med 0,45 l/ha. Brug 250 - 300 l vand/ha. Midlet er godkendt til mindre anvendelse og må anvendes om efteråret fra 5. september til 1. december.