

Udlæg og gødskning af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 11, 2018

- Udlæg af rødsvingel
- Gødskning af rødsvingel

Udlæg af rødsvingel

Udlæg aldrig rødsvingel i vintersæd, hvor der er risiko for væselhaleproblemer.

Sorter af rødsvingel med lange udløbere bør tidligst sås den 20. september. Disse sorter er kraftige i udvikling, og kan udvikle sig for voldsomt og genere hveden ved tidligere såning. Sen såning efter den 10. oktober giver øget risiko for opfrysninger om foråret på udsatte lokaliteter.

Normal udsædsmængde er 5-6 kg pr. ha i et godt såbed. Hvis afbrænding ikke er mulig forud for 2. høstår, kan man sænke udsædsmængden til 4-5 kg pr. ha, som vil give en mere åben plantebestand. Såning på dobbelt rækkeafstand anbefales generelt ved udlæg af rødsvingel i vintersæd. Dette er medvirkende til at holde marken mere åben, også i 2. høstår.

Sorter med korte eller uden udløbere er langsommere i vækst, og disse sorter kan derfor sås fra nu af uden at genere hveden. Her bør udsædsmængden ikke reduceres for meget. Nu udsås 6 kg pr. ha og fra den 20. september 7 kg pr. ha. Såning på dobbelt rækkeafstand anbefales.

Udsædsmængden i hveden kan evt. sænkes med 10 pct. i forhold til anbefalet udsædsmængde på såtidspunktet, hvis der er tale om en kraftigt buskende hvedesort.

Vær opmærksom på at der skal være tre frie år mellem høst og udlæg af forskellige sorter. Afstandskrav mellem forskellige sorter af samme type rødsvingel er 50 meter. Der er kun krav om 1 meters afstand mellem en sort med lange udløbere og en sort med korte eller uden udløbere. Er du i tvivl, så kontakt din konsulent.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd

Express SX kunne være et oplagt valg, men så kan der ikke anvendes Hussar til foråret.

Her i efteråret kan der anvendes 0,3 l Buctril + 0,1 l DFF pr. ha, når hveden har to blade og ukrudtet max. 1-2 løvblade. Anvend kun DFF, hvis rødsvingel frøene er sået og dækket af 1,5 - 2 cm's jord, og der må ikke være udsigt til store nedbørsmængder. 0,5 l Stomp pr. ha kan også anvendes. Ligeledes her skal rødsvingel frøene være dækket af jord.

Gødskning

Normalt gødes rødsvingel efter sidste afpudsning omkring 10. oktober. Der gødes med 70 - 75 kg N pr. ha. Ved udlæg i ærter eller hvidkløver nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

Svage og tynde udlæg er formodentlig allerede gødet med 25 kg N pr ha. Resten af gødningen udbringes omkring 25. september.

De fleste gamle rødsvingelmarker gror for øjeblikket meget kraftigt til. Skulle dette ikke være tilfældet, kan årsagen være N-mangel og da bør kvælstoffet ikke tilføres for sent.

Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man ikke at tilføre om efteråret.

Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2018/19 er 150 kg N pr. ha.

Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof, under forudsætning af "godt udbringningsvejr". Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i græsfrømarker.