

Høst af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 8, 2018

- Tidligste marker høstklar
- Tærsk skånsomt hvis der er væselhale

Blomstringen startede meget tidligt i år omkring den 1. juni. Normalt vil rødsvingel så være klar til høst i den første uge af juli, men i år vil tidlige marker kunne tærskes i løbet af den kommende uge.

Med god vandforsyning går der ca. 35 dage fra hovedblomstring til direkte høst, men hvis det er det meget tørt kan modningen ske tidligere efter ca. 30 dage. Der er henimod 10 dage forskel mellem høsttidspunktet af de tidligste og de sildigste sorter. Du kan finde tidligheden af din sort på vores [hjemmeside](#).

De fleste afgrøderne er meget tvemodne, og derfor skal man også være klar til at kunne styre de mindst modne frø på tørreriet. De tidligst udviklede frø er de største og det bedste udbytte opnås, hvis også disse frø kommer med hjem.

Hold især øje med dryssespild fra de tidlige og spildsomme sorter uden udløbere.

Høstmetode

Rødsvingel er generelt ikke særlig spildsom, så høsten foregår i reglen direkte på roden. En undtagelse herfra er tidlige sorter, ofte uden udløbere, på vindudsatte arealer. Her er der risiko for en del dryssespild, hvis de udsættes for kraftig blæst lige før høst.

Det rigtige tidspunkt for direkte høst er, når den røde farve er gået af, og marken er blevet gulbrun. På dette tidspunkt vil der være under 20 pct. vand i frøene. I de mindre spildsomme sorter vil den optimale vandprocent være 15-16 pct. ved direkte tærskning.

Skårlægning er normalt en nødløsning, men kan være en mulighed, hvis marken er meget tvemoden. Skårlægning skal foretages en uges tid før direkte høst. På dette tidspunkt har afgrøden stadig en rødlig farve.

Vær opmærksom på at fremmede græsser som rajgræs, kvik og blød hejre ofte findes i hjørnerne og i den yderste markkant, hvorfor man bør undlade at høste den yderste halve meter med.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Gode råd til høstarbejdet

- Undersøg bag mejetærskeren, at der ikke spildes frø over soldkassen eller i halmen.
- Sørg for at soldene er belastet så ens som muligt. Det er vigtigt at materialet kommer jævnt fordelt ind i maskinen, således at cylinder/rystere/rotorer og solde belastes ens hele tiden.
- Tjek varen i tanken. Er der afskallede frø tærskes der for hårdt. Er der mange topskud og dobbelt frø tærskes der måske for lempeligt.

I tilfælde, hvor marken er forurenede med væselhale, skal der tærskes lempeligt, således at stakken på væselhalen forbliver intakt. Det letter frørensningen på frørensneriet. Stærkt forurenede områder undlades at tærskes med.

Rumvægt

Som rettesnor vil en normal råvarerumvægt i rødsvingel være 1,75-1,9 kg pr. 10 l, hvilket i mange sorter vil svare til et rensesvind på 15 -18 pct. I enkelte småfrøede sorter med særligt tungt frø kan rumvægten uden problemer komme op over 2,2 kg pr. 10 l.

Efterbehandling

Straks efter høst, dvs. samme dag som frøet høstes, skal frøet på tørreriet, så du undgår, at frøet begynder at tage varme. Start med at belufte med kold luft og afslut med opvarmet luft, hvis det er nødvendigt for at få afgrøden tørret færdigt til 11 pct.

Tørreluften bør aldrig opvarmes mere end 5 - 6°C for at sikre en jævn ensartet nedtørring med minimal risiko for overtørring.

Afslut tørringen med at køle frøet ned.

Pas på spireevnen

Beluft frøet en gang om ugen de første fem uger efter afsluttet nedtørring og derefter en gang om måneden ind til levering.