

Efterårsbehandling af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 9, 2018

- Har udlægget klaret sommertørken?
- Efterårsbehandling i frø- og udlægsmark
- Kvælstof til svage udlæg

Mange udlæg er meget svage og det er først nu efter regnen, det er muligt at konstatere, om planterne har overlevet sommertørken. Her midt i august skal planterne mindst have en størrelse som en 5-krone og være jævnt fordelt. Der kan repareres med eftersåning i tynde pletter, men forvent ikke fuld frøudbytte disse steder. Tørken er gået værst ud over de fine rødsvingel typer, men vi ser også udtørrede udlæg af sorter med lange udløbere. Kontakt din konsulent, hvis du er i tvivl om, at marken skal overleve.

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Stubben fra dæksæden skal pudses af til 4 - 5 cm højde hurtigst muligt, så de nye rødsvingel planter får optimale betingelser til at buske sig. Afpudsningen gør at der kan komme mest mulig lys ned til de små planter. Afklipping af lange slaskede blade, specielt efter vintersædsudlæg, stimulerer planterne til at sætte nye friske blade og sideskud.

Der må ikke ligge mere materiale tilbage efter afpudsningen, end hvad der kan få jordkontakt og forsvinde mellem udlægsplanterne.

Til svage udlæg anbefales at tilføre 30 kg N pr. ha nu for at hjælpe dem igang.

Rødsvingel efter 1. og 2. høstår

Afbrændingsforbuddet og mangel på grovfoder har betydet, at frøgræshalmen er fjernet på de fleste marker. Da vi mister en del af de nye udlæg, har vi åbnet mulighed for at høste frø på 3. års marker, i stedet for et mislykket udlæg. Den bedste behandling forud for 2. og 3. års høst

er afbrænding af halm- og stubrester, men det vil være de færreste, der har denne mulighed.

På nær Bornholm er afbrændingsforbuddet nu ophævet, og det vil kun undtagelsesvist være muligt at afbrænde halm og/eller stubrester i frømarken, dels fordi at tidspunktet for afbrænding er fremskredet og fordi genvæksten har været meget begrænset.

Afpudsning og afgræsning

Hvis frømarken ikke er afbrændt, er det vigtigt, at den pudses helt i bund, gerne ned til 2 - 3 cm's højde. Denne afpudsning foretages bedst med en slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede materiale oven på rødsvingelplanterne, og det bevirker, at materialet har svært ved at blive omsat. Første afpudsning følges op med afpudsninger et par gange i løbet af efteråret efter behov. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at stubben er afbrændt eller afpudset straks efter høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne sribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, inden de flyttes videre.

Sen afgræsning må ikke efterlade græsset kortere end 7 - 8 cm's højde den 1. november.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF