

## Efterhøst behandling i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 8, 2018

- Efterårsbehandling
- Gødskning
- Ukrudtsbekæmpelse

### Afpudsning af stub

Efter høst af dæksæd er det vigtigt at de nye planter busker sig mest muligt, så dæksædsstubben skal pudses i bund i en højde på ca. 5 cm. Afpudsningen stimulerer planten til at sætte nye friske blade og sideskud.

Er der undtagelsesvis mere materiale, end at det kan forsvinde mellem udlægsplanterne, bør det rives sammen og fjernes.

### Strandsvingel efter 1. års høst.

Hvis frøgræshalmen er snittet, vil en dyb afpudsning af stubben sørge for en yderligere findeling og fordeling af halm og stubrester. Kør eventuelt på sned af sårækken for at opnå en bedre fordeling. Halmen tilfører 30-40 kg N pr. ha til strandsvinglen, når halmen nedbrydes og kvælstoffet nedvaskes med nedbør.

Omkring den 10. oktober afpudses for sidste gang i 10-12 cm højde.

Afgræsning med får er en udmærket måde at få marken afpudset, men metoden kræver det rigtige management. Fårene må ikke afgræsse afgrøden for kort i det sene efterår.

### Gødskning

Svage nyudlæg og plænesorter tilføres 30-40 kg N pr. ha nu.

Der gødes færdig først i oktober med op til 110 kg N pr. ha efter korn.

2. års marker gødes efter sidste afpudsning. I plænetyperne kan man eventuelt dele kvælstoffet, 30 kg N først i september og 80 kg N i oktober.

Kvælstofnormen til strandsvingel er 200 kg pr. ha til høst 2019. Ved efterslæt & afgræsning se:

[NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om gødsknings- og harmoniregler.](#)

Gylle kan anvendes i efteråret, og der kan regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammonium-kvælstof, såfremt at der kommer nedbør efter udkørsel. Gyllen skal udbringes senest den 15. oktober på frøgræsmarker.

### Bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Ukrudt kan bekæmpes i september med f.eks. 7,5g Express SX pr. ha + spredklæbemiddel i strandsvingel. Her er det typisk kamille og korsblomstrede arter der generer.

Mod agerstedmoder, tvetand og ærenpris, tilsættes 0,05 l DFF pr. ha. Ønsker man også effekt på nyfremspirende enårig rapgræs øges doseringen af DFF med op til 0,15 l pr. ha.

### Græsukrudt og spildkorn med 1-2 blade

Spildkorn kan bekæmpes i strandsvingel udlagt i dæksæd med 0,12 l Agil pr. ha + spredklæbemiddel. Strandsvingel kan skades af Agil ved høje temperaturer, også i dagene efter behandlingen.

- Over 15°C: 0,1 l Agil pr. ha,
- Over 20°C: maks. 0,08 l Agil pr. ha
- Over 23°C: udsæt behandlingen

Undgå nattefrost i forbindelse med Agil behandling.

[Stomp CS](#) er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs med 1,0 l/ha og har nogen effekt mod rapgræs og væselhale. Midlet udsprøjtes på fugtig jord før ukrudtets fremspiring.

[Topik](#) er godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel og virker mod alm. rapgræs, alm. og ital. rajgræs samt agerrævehale. Der anvendes 0,3 l Topik + 0,5 l Renol pr. ha tidlig i september måned.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF