

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 4, 2019

- Mange gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Marker der ikke er behandlet i efteråret har en stor og kraftig ukrudtsbestand

Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den løsning, der bedst kan klare problemerne. I år er det i mange tilfælde nødvendigt at starte tidligt op for at få styr på det relativt store ukrudt. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet florasulam. Catch, Starane XL, Mustang Forte og Zypar indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof. Blandinger er en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fem løsninger til forskellige situationer:

Mustang Forte

Mustang Forte bekæmper de fleste tokimbladede ukrudtsarter og har samtidig også en sideeffekt på visse rodukrudtsarter. Effekten er dog svag på agerstedmoder og ærenpris, og derfor skal der iblandes DFF for at forstærke effekten. Mustang Forte må anvendes indtil stadie 32, og har nogle restriktioner i forhold til halmanvendelse og efterfølgende afgrøde. **Har sædskiftet andre afgrøder end græs, korn, raps eller majs, eller skal halmen sælges til andet end industri eller afbrænding, bør man sætte sig grundigt ind i restriktionerne.**

0,5-0,75 l/ha Mustang Forte + 0,05 l/ha DFF

Catch

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men bekæmpelsen af burresnerre, kornblomst, rodukrudt og raps er ikke på niveau med Mustang Forte. Catch har problemer med agerstedmoder og ærenpris, og derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen. Oplagt løsning hvor Mustang Forte ikke er muligt.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

0,4-0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

Zypar

I 2018 blev Zypar anvendt en del, og med godt resultat. Midlet har lidt bedre effekt end Catch på storkenæb, hejrenæb og rød tvetand. Kan anvendes ved lave temperaturer.

Der må max. anvendes 1,0 l/ha. Tilsæt evt. DFF for at forstærke effekten mod agerstedmoder og ærenpris. Midlet må ikke bruges i renbestandsudlæg.

0,75 -1,0 l/ha Zypar + 0,05 l/ha DFF

Ariane FG S og Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FGS må ikke bruges i renbestandsudlæg. Ariane FGS er det dyreste middel, men brug den, hvis tidsler er et problem.

1,5-2,5 l/ha Ariane FGS + 0,05 l/ha Primus

Starane XL

Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

1,5 l/ha Starane XL

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet):

[DFF](#), [Mustang Forte](#), [Zypar](#) og [Catch](#)