

Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning

FrøavlsINFO nr. 8, 2019

- Afsluttende svampebehandling ved blomstring
- Sortrust elsker varme og tørre forhold

Foråret 2019 har budt på tørke mange steder, men de seneste uger har rettet lidt op på situationen, og mange rajgræsmarker står i dag fint. Der har generelt været mere angreb af kronrust i markerne end normalt, og de fleste marker er behandlet i forbindelse med vækstreguleringen. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning.

Den vigtigste svampebehandling udføres ved blomstringen, som går i gang inden for de kommende to uger afhængig af sort og beliggenhed. Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod blomstring, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv og udbyttekrævende svamp, som vi kan især kan forvente under varme og tørre forhold.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Sortrustangreb kan gå kraftigt ud over frøudbyttet, så det er derfor en svampesygdom, som vi skal være godt forberedte på.

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, der er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.



Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring.

Aktuelle midler

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan anvendes 0,5 l Bell eller 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,4 l Viverda pr. ha.

Skadedyr

Bekæmpelse af skadedyr som mider og lus kan være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Karate 2,5 WG er off-label godkendt til frøgræs.