

### Efter-høst opgaver i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 10, 2019

- **Afpudsning af stub**
- **Enårig- og alm. rapgræs, skadedyr, snegle, rust og starthjælp til svage udlæg**

Flereårsmarker skal afpudses til en stubhøjde på 3-5 cm, og de gamle stubrester skal slås helt af. En skiveslåmaskine med skarpe knive er billigst og hurtigst til afpudsning-opgaven. I 1. års marker skal dæksædsstubben afpudses til en stubhøjde på 5-6 cm, så snart kornet er høstet. Stubben er forholdsvis skør i år, så en slaglepudser vil kunne slå stubben godt af. Engrapgræsudlæg i vintersæd er kraftigt udviklet over jorden men har et lille rodsystem med få udløbere under jorden. Her er det vigtigt at få bladene pudset helt i bund så planten stimuleres til at udvikle udløbere, der danner grundlaget for frøstænglerne til næste år.

Afgrøder i god vækst afpudses igen omkring 1. september og 1. oktober i en højde på 6-8 cm. I frodige år, kan en ekstra afpudsning midt i oktober være aktuel hvis bladene hænger.

#### Nyfremspiret enårig og alm. rapgræs

Bekæmpelse af småt og nyfremspiret enårig- og alm. rapgræs kan ske med Boxer og/eller Stomp CS. Alternativt anbefales 0,1 l DFF pr. ha på fugtig jord, så snart nyfremspiret græsukrudt kan anes. Mod enårig- og alm. rapgræs virker DFF kun som jordmiddel, så der må ikke være for meget plantemateriale på jorden, når der behandles.

0,02 Hussar OD + 0,5 olie eller 0,05 Hussar Plus OD + olie pr. ha, har effekt på etableret enårig rapgræs og små planter alm. rapgræs. Hussar må anvendes indtil 15. september.

#### Agil

Agil anvendes mod spildkorn og græsukrudt med op til 0,12 l pr. ha i engrapgræs efter høst af dæksæd. Tilsæt 0,1 Lissapol pr. ha. Lav en tidlig behandling så snart græsukrudt/korn er fremspiret. Pas på skade ved høje temperaturer. Ved 18°C bør der max. bruges 0,08 Agil pr ha.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

Ved 12°C kan der anvendes op til 0,12 l Agil pr. ha. Brug ikke Agil ved udsigt til over 20°C.

#### Skadedyr

Fritfluer i nyudlæg og galmyg i gamle marker har flyvning i de kommende uger. Sæt fangbakker ud og følg med i flyvningerne. Ved væsentlig forekomster behandles med et pyrethroid i forhold til konstateret flyvning. Tjek også for bladlus, der sidste år gav anledning til viruspletter, hvor planterne mistrivedes. Hold også et vågent øje med snegle, som beskrevet i FrøavlsINFO nr. 9

#### Rustsvampe

Engrapgræs med N-mangel bliver let angrebet af rustsvampe. Vi ser ofte større effekt ved at tilføre kvælstof end ved at svampesprøjte, men svage 1. års udlæg kan hjælpes på vej med en svampesprøjtning i efteråret. Folicur Xpert og Folicur EW 250 med 0,15-0,3 l pr. ha er godkendt til mindre anvendelse mod rust om efteråret.

#### Gødskning

Undgå at svage udlæg mangler kvælstof. Tilfør 25 - 40 kg N pr. ha snarest, så planterne får en god start. Engrapgræs skal have en pæn størrelse inden planterne danner underjordiske udløbere, så det gælder om at stimulere væksten de kommende par måneder. Udløberne skal være dannet inden vinter, ellers bliver der for få frøstængler næste forår. Kraftige udlægsmarker kan vente med at få tilført kvælstof til midt i september.

Vi anbefaler at tilføre 45-60 kg N pr. ha. i 1. års marker efter hvidkløver og 60-80 kg N i marker udlagt i ærter, korn og til flerårsmarker.

Engrapgræs udlagt i vintersæd, splitgødskes med to gange 40 N pr. ha.

#### Gødningsnorm til engrapgræs høst 2019:

Marktyper (Balin, Chester, Oxford, Lato): 160 kg N pr. ha

Plænetyper (andre sorter): 170 kg N pr. ha