

## Skadedyr i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 11, 2019

- **Flyvning af galmyg - sæt fangbakker ud i din mark**

I de seneste år har vi set mange skadedyrsangreb i vores engrapgræsmarker. Så voldsomme angreb at markerne er endt med at måtte opløjes.

Der flyver mange forskellige insekter i frøgræsmarkerne i disse dage, hvoraf nogle kan skade de nye skud med udbyttereducerende effekt til følge.

Angreb af engrapgræsmyg bliver voldsommere jo ældre markerne bliver. Afbrænding af de lange typer af engrapgræs nu, hjælper helt sikker mod skadedyrsangreb, men har man ikke den mulighed, skal fangbakkerne ud i marker nu, og der skal holdes skarpt øje med flyvninger af insekter.

Som udgangspunkt er det nyttigt at begrænse populationen af engrapgræsgalmyggen. Men

eftersom vi ikke præcist ved, hvornår efterårsflyvningen sker, så en eventuel behandling kan målrettes engrapgræsgalmyggene, må man følge med i egne marker og se, om antallet af engrapgræsgalmyg stiger.

Også fritfluer kan skade de nye skud, da fluerne lægger æg i hjerteskuddet som bliver gult og dør efterfølgende.

Sidste år så vi skade af bladlus, der forekom i stort antal i nogle engrapgræsmarker, hvor planterne efterfølgende mistrivedes og stort set ikke satte frøstængler. Så hold øje med bladlus, særligt med de høje sommertemperaturer vi ser nu.

De første meldinger om fangst af engrapgræsgalmyg er indrapporteret.

Skadevoldende insekter kan behandles med et pyrethoid, eksempelvis Karate 2,5 WG.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

			
Plastbakke med vand + en dråbe sulfo udsat i engrapgræsmark.	Masser af små galmyg fra fangbakke placeret i en 2. års engrapgræs. Ikke alle typer galmyg skader engrapgræs	Den rigtige engrapgræsgalmyg er behåret på vingerne og er lidt større end svampemyggen	Svampemyggen - laver skader ikke engrapgræs