

## Hussar mod enå. rapgræs og småt alm. rapgræs i engrapgræs

FrøavlINFO nr. 2, 2019

- **Tidlig sprøjtning er vigtig**
- **Split-sprøjtning øger effekten**
- **Hussar bekæmper enårig rapgræs**

Enårig- og alm. rapgræs gror stort set hele året. Jo tidligere man får stoppet væksten af disse ukrudtsplanter des bedre. Hussar virker optimalt fra 8 grader C. Midlet optages af planternes skud og blade, så behandlingen kan udføres, så snart planterne er i vækst om foråret. Hussar bekæmper enårig rapgræs og reducerer væksten af alm. rapgræs. Hussar har også effekt på blandt andet kamille, fuglegræs og mælkebøtte.

### Valg af middel

**Hussar OD** er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha, med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha. Hussar OD er skånsom over for engrapgræs, og anbefales i svagt etablerede marker indtil vi får flere erfaringer med Hussar Plus OD.

**Hussar Plus OD** er sammensat af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD. Den kan anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Vi anbefaler en splitsprøjtning med 0,05-0,07 l pr. ha fulgt op med 0,05-0,07 l pr. ha 2-3 uger senere. Der må anvendes i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. 0,14 l Hussar Plus OD svarer til 0,07 l Hussar OD og 0,105 l Atlantis OD. Jo større tuer af enårig rapgræs jo højere dosering i første behandling.

Hussar Plus OD har en bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD men kan

også være hårdere mod engrapgræsset. Det skal der tages hensyn til, hvis engrapgræsset er svækket. Rådfør gerne med din frøavlkonsulent.

### Tidspunkt

Tidlig behandling, gerne i marts, er normalt både mere effektiv og mere skånsom end behandlinger i april. Selvom temperaturen kommer lige under frysepunktet om natten, kan man godt anvende Hussar den følgende dag, men undgå at behandle, hvis vejrudsigten lover adskillige frostgrader.

Der skal være grønt plantevæv på det enårlige rapgræs, for at midlerne optages og virker.

### Anbefaling

#### Uden Hussar i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,03-0,04 l Hussar OD + 0,5 l olie

2-3 uger senere:

0,04-0,07 l Hussar OD + 0,5 l olie

#### ELLER

Fra nu pr. ha:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

#### Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,04-0,08 l Hussar OD + 0,5 l olie

#### Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

**Bemærk, at Hussar OD ikke må bruges i samme vækstår i kombination med Hussar Plus OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. tribenuron-methyl produkter som Express m.fl.**

Med venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF