

## 1. års engrapgræs, bortsprøjtning af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 9, 2019

- MCPA, både før og efter kløverhøst
- Zypar til bortsprøjtning af kløver i engrapgræs
- Hussar mod kløver og enårig rapgræs
- Snegle

### Bortsprøjtning af hvidkløver forud for engrapgræs

I de hvidkløvermarker, hvor der er udlagt frøgræs til høst 2020, skal kløvergenvæksten sprøjtes væk, så snart kløveren er i vækst, hvilket den er nu i mange marker.

Zypar er godkendt til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs med 1,0 l pr. ha eller to gange 0,5 l pr. ha i august.

MCPA er godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs til bortsprøjtning af kløver med 1,0 l pr. ha. Tjek på [Middeldatabasen](#) hvilke handelspræparater af MCPA, der er godkendt. Anvendelse må ske frem til den 1. september.

Midlerne må kun anvendes én gang pr. vækstsæson 2019/20. MCPA anvendt til nedvisning før kløverhøst tæller med til vækstsæsonen 2018/19.

Én behandling til bortsprøjtning af hvidkløver er ofte ikke tilstrækkeligt. Derfor skal der udføres en supplerende behandling i efteråret med 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. Bemærk, at Express og Hussar ikke må bruges i

samme afgrøde, og Express er derfor ikke interessant.

Til bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs anbefaler vi 1 l Zypar eller 1,0 l MCPA pr. ha senest 31. august, efterfulgt af 0,02 l Hussar OD eller 0,05 l Hussar Plus OD pr. ha. 10-14 dage senere Der tilsættes 0,5 l Renol pr. ha. Hussar må senest anvendes den 15. september.

MCPA behandlingen vil også have en sideeffekt mod agertidsler, når disse er i god vækst. Hussar vil foruden effekten på genvækst og nyfremspiret kløver også have effekt på småt enårig rapgræs.

### Snegle

Selvom det er længe siden, vi har set noget til snegle, vil fugtigt vejr sikkert få dem "frem i lyset" igen. Vær opmærksom på at sneglene kan skade engrapgræsudlægget alvorligt.

Mod snegle kan der anvendes sneglekorn, jern(III)fosfat-granulat som f.eks. Ferramol /Sluxx. Hvis sneglekornene bliver ædt inden for få dage, skal der genbehandles. Det er den tidlige/første behandling, der sikrer at engrapgræsset får fodfæste. Kør sneglemidlet ud om aftenen, så det ikke ædes af måger m.m. inden sneglene får muligheden for at indtage måltidet.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF