

Høst af hundegræs

FrøavlsINFO nr. 7, 2019

- Varmt, tørt og solrigt vejr fremmer modningen
- De tidligste marker forventes at blive klar til skårlægning i begyndelsen af uge 27
- Gode råd til høstarbejdet

Der går 25-28 dage fra bestøvning til skårlægning. Hundegræsmarkerne har blomstret i begyndelsen af juni, så de fleste marker skal skårlægges i uge 27.

Der er lidt variation i de forskellige sorters modningstidspunkt. Amba, Sparta, Lyra, og Treposno hører til de tidligste sorter, mens Athos, Aldeberan, Donata og Pizza er nogle dage senere moden.

Vækstreguleringen har i år ikke alle steder været effektiv nok, og der er lidt lejesæd i nogle marker, hvilket besværliggør skårlægningen. Den sidste fase af modningen forløber meget hurtigt og dagligt tilsyn er nødvendigt. Når afgrøden nærmer sig skårlægningstidspunktet, får marken et gult til gulbrunt skær, bladene visner, og frøene bliver voksagtige.

Ved et let slag af toppen i hånden falder de første frø af. Ved udsigt til blæst bør skårlægningen evt. ske 1-3 dage tidligere end ellers.

Fremmede ukrudtsgræsser ofte findes i den yderste markkant, så undlad at høste den yderste halve meter med. Vær særlig opmærksom på rajgræs, der er svær at rense fra, og som især forekommer i forpløjninger

Skårlægning

Skårlægningen foretages med selvkørende skårlægger, der laver et forholdsvis tykt skår, der er kan hindre gennemgroning og opfange spildfrø. Skåret bør ikke være for tyndt, da frøene så let falder igennem, ligesom genvækst i marken hurtigt vil gro igennem skåret. Modsat vil meget kraftige skår kræve u hensigtsmæssig lang vejringstid.

Af hensyn til en god og ensartet vejring, anbefales det at afsætte en stubhøjde på 10-15 cm ved skårlægning.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Tærskning

Hundegræs er tvemoden og skal ligge 12-14 dage på skår. Ved kun 8-10 dages vejring risikerer man at påføre de umodne frø tærskeskade med nedsat spireevne til følge.

Broafstand og cylinderhastighed afpasses efter afgrøden. For hård tærskning kan give et stort indhold af afskallede frø med væggtab og nedsat spireevne til følge.

Opsamling af skåret kan ske med akshævere eller pick-up, som er meget velegnet i hundegræs. Da genvækst kan være voldsom i hundegræs, kan det være nødvendigt at bruge vinden, der skal være trukket helt tilbage, så frøene ikke spildes foran skærebordet.

Råvarekvalitet

En m³ råvare skal veje mellem 190 og 220 kg for at få et tilfredsstillende lavt rensesvind på 15-20 pct.

Dette er en grov rettesnor, som ikke gælder, hvis der i frøet er unormalt stort indhold af f.eks. enårig rapgræs eller spildkorn.

Efterbehandling

Selv færdigvejrede og tilsyneladende tørre partier skal beluftes for at sikre spireevnen og lagerfastheden. Blæs med kold luft straks efter høst i 1-2 dage og tilsæt derefter evt. varme for egentlig nedtørring, hvis der er behov for det. Frøet bør tørres ned til ca. 11 pct. vand.

Behandling af frømarken efter høst

Skal frømarken genhøstes, kan halmen snittes på marken. Sørg for en jævn fordeling. Herved reduceres opformering af græsukrudt som f.eks. væselhale og alm. rapgræs.

Den gamle frøstub skal afhugges i ca. 7 cm's højde. Herefter kan man vælge at tage et slæt i september, eller alternativt afpudse marken et par gange.

Ønsker man at anvende afpudsningen, bør man straks efter høst gøde med 60 kg N pr. ha. Efter afgræsning eller afhøstning tilføres 45-60 N pr. ha ca. 1. oktober. Alternativt kan afbænding straks efter frøhøst være en mulighed, men vær opmærksom på regler omkring brandbælter og røggener.