

Udlæg af hybrid rajgræs i renbestand

FrøavlsINFO nr. 7, 2019

- Gode betingelser for såning i renbestand
- Gødskning af nye udlæg

Hybrid rajgræs sås normalt fra sidst i august til først i september.

Erfaringerne viser, at der er færre problemer med sneskimmel og rajgræsmosaik i de efterårsudlagte arealer, som udbyttmæssigt normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte arealer.

Jordbearbejdning - pløjning

Et godt pløjearbejde forud for etablering er en stor fordel. Spildkorn og frø af ukrudtsgræsser skal ned i bunden af furen. Indstilling og kørselshastighed ved pløjning er vigtigt, så afgrøderester ikke kastes over på forrige fure og dermed kommer til at ligge i en dybde, hvor frø kan spire frem i såbedet.

Såning uden pløjning kan være en mulighed ved såning efter f. eks. raps, hvor der ikke er problemer med spildkorn. Ved etablering uden pløjning er det meget vigtigt at kende bestanden af ukrudtsgræsser. Gold- og blød hejre eller

væselhale kan umuliggøre dyrkning af frø. Glyphosatbehandling før såning er nødvendigt.

Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd, men stadig skal udsædsmængden afstemmes efter sortens frøstørrelse.

Som udgangspunkt anbefaler vi 12 kg pr. ha i de tetraploide sorter og 10 kg pr. ha i diploide sorter. Sådybde 2-3 cm.

Gødskning

For at sikre en hurtig og tilstrækkelig udvikling af planterne, kan der ved såning i renbestand tilføres en mindre mængde kvælstof.

Ved såning i september er det tilrådeligt at give kvælstofmængde på 25-30 kg N pr. ha ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF