

## Udlæg af ital. rajgræs i renbestand

FrøavlsINFO nr. 7, 2019

- Gode betingelser for såning i renbestand
- Gødskning til nyt udlæg

Ital. rajgræs sås normalt fra sidst i august til først i september, men såning i første halvdel af september kan forsvares. Erfaringerne viser, at der er færre problemer med sneskimmel og rajgræsmosaik i de efterårsudlagte arealer, som udbyttmæssigt normalt er fuldt på højde med de forårsudlagte arealer.

### Jordbearbejdning - pløjning

Et godt pløjearbejde forud for etablering er en stor fordel. Spildkorn og frø af ukrudtsgræsser skal ned i bunden af furen. Indstilling og kørselshastighed ved pløjning er vigtigt, så afgrøderester ikke kastes over på forrige fure og dermed kommer til at ligge i en dybde, hvor frø kan spire frem i såbedet.

Såning uden pløjning kan lade sig gøre hvis der sås efter f. eks raps. Ved etablering uden pløjning er det meget vigtigt at kende bestanden af ukrudtsgræsser. Gold- og blød hejre eller

væselhale kan umuliggøre dyrkning af frø. Glyphosatbehandling før såning er nødvendigt.

### Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd, men stadig skal udsædsmængden afstemmes efter sortens frøstørrelse.

Som udgangspunkt anbefaler vi 10 kg/ha i de diploide og 12 kg/ha i de tetraploide sorter. Sådybde 2-3 cm.

### Gødskning

For at sikre en hurtig og tilstrækkelig udvikling af planterne, kan der ved såningen tilføres en mindre mængde kvælstof.

Ved såning i september er det tilrådeligt at give kvælstofmængde på 25-40 kg N pr. ha som udbringes ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF