

Gødskning af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 11, 2019

- Afsluttende gødskning af rødsvingel
- Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd

Normalt gødes rødsvingel efter sidste afpudsning omkring 10. oktober. Der gødes med 70 - 75 kg N pr. ha. Ved udlæg i ærter eller hvidkløver nedsættes mængden til ca. 50 kg N pr. ha.

Svage og tynde udlæg er formodentlig allerede gødet med 25 kg N pr. ha. Resten af gødningen udbringes nu.

De fleste gamle rødsvingel marker gror for øjeblikket fornuftigt til. Skulle dette ikke være tilfældet, kan årsagen være N-mangel, men en anden mulighed kan være skadedyrsangreb. Er man i tvivl så kontakt din frøavlskonsulent.

Ved normale fosfor- og kalital anvendes ren kvælstofgødning. Ved meget lave tal kan med fordel anvendes NPK-gødning. Svovl behøver man ikke at tilføje om efteråret. Kvælstofnormen til rødsvingel høst 2019/20 er 150 kg N pr. ha.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Gylle kan anvendes når fordelingen er præcis og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Der kan regnes med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof, under forudsætning af "godt udbringingsvejr".

Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober i græsfrømarker.

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel udlagt i vinterdæksæd

Express SX kunne være et oplagt valg, men så kan der ikke anvendes Hussar til foråret.

Her i efteråret kan der anvendes 0,3 l Bucril + 0,1 l DFF pr. ha, når hveden har to blade og ukrudtet max. 1-2 løvblade.

Anvend kun DFF, hvis rødsvingel frøene er sået og dækket af 1,5 - 2 cm's jord, og der må ikke være udsigt til store nedbørsmængder.

0,5 l Stomp pr. ha kan også anvendes. Også her skal rødsvingel frøene være dækket af jord.