

Ukrudtsbekæmpelse i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2019

- Tokimbladet ukrudt i frømarken
- Spildkorn og agerrævehale
- Bladsvampe

I marker med højt ukrudtstryk, er det nødvendigt at starte ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret.

Primus + DFF

Denne løsning er aktuell nu, specielt hvor kamille er hovedproblemet. Sammen med DFF bekæmpes også store planter af agerstedmoder, samt mindre planter af ærenpris og tvetand

0,075 l Primus/Saracen + 0,05 l DFF pr. ha.

Zypar + DFF

Zypar har specielt god effekt på hundepersille, storkenæb og lægejordrøg, men bekæmper også de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor. Temperaturkravet er relativt lavt, så en behandling med Zyper er aktuell nu.

0,75 - 1,0 l Zypar + 0,05 l DFF pr. ha.

Catch + DFF

Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse, men den mangler lidt styrke på burrenerre og kornblomst. DFF kan eventuelt tilsættes som nævnt ovenfor. Denne løsning er også aktuell nu.

0,6 l Catch + 0,05 l DFF pr. ha.

Starane XL

Er hovedproblemet burrenerre er Starane XL specielt effektiv. Temperaturkravet er på 10-15°C, hvilket ofte gør, at behandling må trækkes til slutningen af april/først i maj. Løsningen er relativ dyr.

1,5 l Starane XL pr. ha.

Ariane FG S + Primus

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l pr. ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l pr. ha. Ariane FG S er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Temperaturkravet er på mindst 15°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus/Saracen er en god all-round løsning mod frø- og rod ukrudt på det sene tidspunkt. Løsningen er effektiv men dyrere end de øvrige.

1,5 - 2,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha.

Er problemet kun tidsler på et sent tidspunkt, anvendes mindst 1,75 l pr. ha Ariane FG S i varmt vejr. Følgende midler er godkendt til mindre anvendelse i rødsvingel.

Vejledningen for de enkelte midler kan hentes ved at klik på midlet: [DFF](#), [Zypar](#), [Catch](#), eller på [Middeldatabasen](#). DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Agil

Konkurrerende spildkorn og agerrævehale, bekæmpes bedst i april, inden det bliver for kraftigt. Begge dele vil ofte nå at blive for kraftige, hvis det først skal bekæmpes sammen med grove græsser i maj. Spildkorn og agerrævehale kan bekæmpes/hæmmes med 0,4 l Agil pr. ha. Bemærk at der i alt må anvendes 0,8 l pr. ha Agil pr. vækstsæson. Behandlingen følges op i maj med Focus Ultra.

0,4 l Agil pr ha + 0,1 l spr.kl.mid. pr. 100 l vand

Bladsvampe

I nogle rødsvingel marker ser vi ind imellem en del meldug. Disse angreb er forbigående og forsvinder normalt af sig selv i løbet af et par uger. Bladpletsvampe kan undertiden forekomme i kraftige angreb. Nye forsøg tyder på, at i ikke afbrændte marker med meget plantemateriale fra efteråret, kan der være merudbytter for en svampebekæmpelse i foråret, såfremt afgrøden er generet af bladpletsvampe.

Størst merudbytte i forsøg er opnået ved anvendelse af 0,5 l Bell + 0,375 l Comet Pro pr. ha midt i maj.

De virksomme stoffer i Bell og Comet Pro findes i Viverda, der er godkendt i frøgræs. Viverda anvendes med 0,4 l pr. ha.