

## Efterårsbehandling af rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2019

- Såning i renbestand en mulighed
- Kør med DFF lige efter såning

Såning i renbestand kan ske frem til 10. september, og frøudbyttet i renbestand er fuldt på højde med udlæg i vårbyg. Rajsvingel består af to typer, nemlig standsvingeltypen og rajgræstypen. Det er normalt kun sorter af rajgræstypen, der kan sås i renbestand. Du kan se liste over sorterne [her](#).

### Tilberedning af såbedet

Såbedets beskaffenhed er af stor betydning for fremspирingen af rajsvingel, men også for at undgå generende konkurrence fra spildkorn eller andet spildfrø, er det vigtigt, at tilberedningen af såbedet udføres korrekt.

Er forfrugten korn, bør der pløjjes, så spildkornet ikke generer græsset i løbet af efteråret. Dette gælder også, når der er tale om vårbyg. Ved pløjningen skal der tages højde for, at forplovefene får det afskrællede materiale ned i bunden af furen, så kernerne ikke kan spire frem.

### Udsædsmængde

Planternes kortere udviklingsperiode ved såning i renbestand medfører en mindre buskning med deraf færre frøstængler pr. plante. Derfor bør udsædsmængden øges med ca. 20 pct. i forhold til udlæg i dæksæd.

Som udgangspunkt anbefaler vi 8-10 kg pr. ha og en sådybde på 2-3 cm.

### Gødskning

Ved såning ind i september er det tilrådeligt at udbringe 25-30 kg N pr. ha ved såning.

Gødningen kan tilføres som NPK eller en ren kvælstofgødning.

### Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i renbestand

For at få en effekt på enårig rapgræs anvendes mellem 0,1-0,15 l DFF pr. ha, udsprøjtet under gode fugtighedsforhold.

### Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel udlagt i vårbyg

Der er ikke de store muligheder for at bekæmpe ukrudt om efteråret i rajsvingel. Det er også sjældent nødvendigt på grund af den kraftige vækst.

### Puds stubben i udlægsmarken

Hvis kornet er høstet med lang stub anbefaler vi at afpudse stubben efter høst, når man kan køre uden at lave spor i marken.

Udlægsmarker af rajgræstypen er sjældent svage, men hvis de forekommer, kan der med fordel tilføres 25-30 kg N pr. ha for at sætte gang i væksten. Derimod er det altid nødvendigt at tilføre udlægsmarker af strandsvingeltypen kvælstof i efteråret. Tilfør 50-60 kg/ha N i midten af september.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF