

Vækstregulering og svampebekæmpelse i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 6, 2019

- Vækstregulering aktuel i kraftige marker
- Svampebekæmpelse kan vente

Vækstregulering

Strandsvingel giver en meget positiv udbytterespons for vækstregulering. Der anvendes normalt 0,8 l Moddus pr. ha i maj i perioden fra strækingsstadiet frem til begyndende skridning.

I kraftige marker med højt N-niveau og fodertyper af [strandsvingel](#), kan det være en fordel at vækstregulere to gange.

Anbefaling:

- Som udgangspunkt anbefaler vi en vækstregulering med 0,8 l Moddus M pr. ha eller tilsvarende produkt ved st. 49, lige før begyndende skridning i maj. Husk spredeklæbemiddel.
- I kraftige velgødede marker i god vækst og med god vandforsyning, kan man indlede vækstreguleringen med 0,4 l Moddus-produkt pr. ha når 2. knæ kan erkendes på 10 pct. af stænglerne.
I den opfølgende behandling ved st. 49 justeres doseringen efter afgrødens vækst og vandforsyning. Her anvendes 0,4 l pr. ha af et Moddus produkt, som kan forstærkes med op til 0,75 l Medax Top pr. ha med.

Bemærk at den maksimale dosering i alt er 0,8 l pr. ha af et Moddus-produkt pr. vækstsæson. Find oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer [her](#).

Det er kun tilladt at opfodre vækstreguleret frøgræshalm, hvis der ikke behandles senere end stadiet 33 med Moddus. Medax Top behandlede afgrøder må ikke opfodres.

Ved anvendelse af Moddus er det vigtigt, at afgrøden er velgødet, der er gode vækstforhold og god vandforsyning, samt dagtemperaturer over 15 grader.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Svampebekæmpelse i strandsvingel


Meldugbekæmpelse i strandsvingel har i forsøgende ikke vist den store lønsomhed. Angreb af meldug i strandsvingel udvikler sig hurtigt, og kan blive så kraftige at marken støver af meldug. Normalt forsvinder angrebet igen, også uden brug af svampemiddel. I forbindelse med en tidlig vækstregulering skal der derfor normalt ikke medtages et svampemiddel.

Fra begyndende skridning og frem til blomstring kan der behandles med 0,2 - 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha.

Bell er især aktuel, hvis der er bladpletsvampe i afgrøden. Dosering er 0,5-0,75 l/ha Bell uden blandingspartner. Svampebehandlet frøgræshalm må ikke opfodres.

Bland kun svampemidler og Moddus hvis afgrøden der er velforsynet med vand.

Sidste år, hvor forholdene var meget tørre, så vi afgrødeskade, hvor svampemiddel og vækstreguleringsmiddel blev blandet sammen.



Strandsvingel Kora, den 8. april 2019, ca. 30 cm høj.