

Hussar mod enå. rapgræs og småt alm. rapgræs i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2020

- Tidlig sprøjtning er vigtig
- Split-sprøjtning øger effekten
- Hussar bekæmper enårig rapgræs

I et år som dette gror enårig- og alm. rapgræs hele året, og Reglone behandlingen har de fleste steder haft for ringe effekt med manglende vintervej efter behandlingen. Jo tidligere man får stoppet væksten af enårig- og alm. rapgræs des bedre. Hussar virker optimalt fra 8 grader C. Midlet optages af planternes skud og blade, så behandlingen kan udføres, så snart planterne er i vækst om foråret. Hussar bekæmper enårig rapgræs og reducerer væksten af alm. rapgræs. Hussar har også effekt på blandt andet kamille, fuglegræs og mælkebøtte.

Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha, med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha. Hussar OD er skånsom over for engrapgræs.

Hussar Plus OD er sammensat af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD. Den kan anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Vi anbefaler en splitsprøjtning med 0,05-0,07 l pr. ha fulgt op med 0,05-0,07 l pr. ha 2-3 uger senere. Der må anvendes i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. 0,14 l Hussar Plus OD svarer til 0,07 l Hussar OD og 0,105 l Atlantis OD. Jo større tuer af enårig rapgræs jo højere dosering i første behandling.

Hussar Plus OD har en bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD men kan også være hårdere mod engrapgræsset. Det skal der tages hensyn til, hvis engrapgræsset er svækket. Rådfør gerne med din frøavlskonsulent.

DFF kan kombineres med Hussar, med en dosering på 0,1 l DFF pr. ha. DFF's jordefekt kan forebygge mod nyfremspiring af enårig rapgræs, f.eks. i 1. års marker i områder uden plantedække. Agerstedmoder og i nogen grad ærenpris og tvetand bekæmpes ligeledes. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Tidspunkt

Tidlig behandling, gerne i marts, er normalt både mere effektiv og mere skånsom end behandlinger i april. Selvom temperaturen kommer lige under frysepunktet om natten, kan man godt anvende Hussar den følgende dag, men undgå at behandle, hvis vejrudsigten lover adskillige frostgrader.

Der skal være grønt plantevæv på det enårige rapgræs, for at midlerne optages og virker.

Anbefaling

Uden Hussar i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,03-0,04 l Hussar OD + 0,5 l olie

2-3 uger senere:

0,04-0,07 l Hussar OD + 0,5 l olie

ELLER

Fra nu pr. ha:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,04-0,08 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Bemærk, at Hussar OD ikke må bruges i samme vækstår i kombination med Hussar Plus OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. tribenuron-methyl produkter som Express m.fl.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF