

Gødskning af hundegræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2020

- Hundegræs skal gødes fra starten af marts
- Optimal kvælstofforsyning om foråret er 120-130 kg N pr. ha

Gødskningstidspunkt

Vi nærmer os stille og roligt det tidspunkt, hvor væksten i hundegræs begynder.

Fra starten af marts vil det være aktuelt at udbringe gødning til hundegræs, forudsat at jorden er farbar.

Tidlig gødskning bedst.

Ved tidlig gødskning i marts opnås klart flere frøstængler, end hvis man venter til april.

I hundegræs har antallet af frøstængler den største indflydelse på udbyttet. Derfor får man både det højeste udbytte og de mest renstråede marker ved tidlig N-tildeling.

Kvælstofnorm

Kvælstofnormen for hundegræs 2019/2020 er 200 kg N pr. ha.

Kvælstofniveau

Som sum af efterår og forår skal hundegræs have ca. 180-190 kg N pr. ha.

Om efteråret gødes typisk med 60 kg N pr. ha, og derfor skal hundegræs tilføres 120-130 kg N pr. ha om foråret.

Kvælstofprognosen har ingen indflydelse på mængden, der skal tilføres i frøgræs.

[Her](#) kan du se en oversigt over sorternes egenskaber.

Med venlig hilsen

Avlsafdelingen

DLF

Fosfor, kalium og svovl

P og K kan tilføres enten efterår eller forår. Der skal være ca. 20 kg P, 50 kg K til rådighed pr. ha. Det beskedne behov kombineret med græssets kraftige rodnet betyder, at der på normalt velgødede marker oftest er nok P og K til rådighed.

Gødskning med P og K kan derfor undlades et enkelt år, især hvis halmen snittes.

Behovet for svovl på 10-20 kg/ha kan dækkes ved at bruge svovlholdige N-gødninger om foråret. Behovet er mindst på jorde som hyppigt tilføres gylle eller anden form for husdyrgødning.

Gylle

Hundegræs er en af de frøafgrøder, hvor gylle bliver anvendt i stor udstrækning. På grund af risiko for genvækst i høst anbefaler vi, at kun omkring halvdelen af forårgødskningen dækkes af gylle, resten tildeles i form af ren N-gødning. Gylle indeholder 0,3-0,4 kg S pr. ton, men kun en mindre del er plantetilgængeligt her og nu. Derfor bør man supplere med en svovlholdig gødning, f.eks. svovlsur ammoniak eller NS20-10.

Er der anvendt store mængder gylle om efteråret, bør forårgødskningen indrettes efter, at der kan være en eftervirkning af gyllen om foråret.

Sørg for en perfekt fordeling, samt en nøjagtig værdiansættelse af gyllens kvælstofindhold, så man undgår uensartede og tvemodne afgrøder.

Vi kalkulerer med 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammoniumkvælstof ved optimale spredforhold.