

## Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2025

- **Nyudlæg i ærter og vårbyg**
- **Bekæmpelse af enårig rapgræs og tidsler starter i dækafgrøden**
- **Opfølgning i vintersæd**
- **Mustang Forte er stærk mod tidsler**

### Udlæg i ærter

Anvend Stomp CS + Fighter 480 med 10 – 14 dages mellemrum.

1. Behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet.
2. Behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.

Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l pr. ha Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles.

**Ved anvendelse af Stomp CS skal frøene være dækket af mindst 1 cm jord.**

### Udlæg i vårbyg

#### **Mod enårig rapgræs**

DFF kan anvendes med op til 0,1 l pr. ha umiddelbart efter såning på fugtig jord. Sørg for at bakkesvingel frøene er dækket af mindst 1,5 cm jord for at undgå skade. Ved større nedbørsmængder umiddelbart efter behandlingen, kan bakkesvingel skades af DFF.

**Hussar OD** må anvendes med 0,035 l pr. ha og **Hussar Plus OD** med 0,05 l pr. ha mod fremspiret enårig rapgræs samt vindaks og rajgræs. Begge midler har også bred effekt på tokimbladet ukrudt. Der tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

#### **Tokimbladet ukrudt**

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Pixxaro, Zypar, Catch, Starane XL eller Express 50 SX, der alle har bred effekt overfor mange ukrudtsarter.

### **Løsningsforslag:**

- **0,5–0,75 l Mustang Forte pr. ha**  
**Eller**
- **0,25 l Pixxaro + 5 g Express 50 SX pr. ha**  
**Eller**
- **0,25 l Pixxaro + 0,05 l Hussar Plus OD + 0,5 olie pr. ha**

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

Til bekæmpelse af tidsler er Mustang Forte bedst. Men husk der er restriktioner i forhold til den efterfølgende afgrøde ved anvendelse. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på [etiketten](#).

MCPA kan også anvendes mod f.eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha senere i byggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. MCPA virker bedst ved god temperatur, min 20° C. Det er vigtigt at trække behandlingen, til der er flest mulige blade på tidslerne.

**Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt, kan anvendes i selve frømarken.**

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge resistens. Er der **ikke** anvendt DFF i forbindelse med såningen, kan der iblandes **0,05 l pr. ha DFF** i en senere behandling, f.eks. mod agerstedmoder og ærenpris. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Anvend kun Hussar, hvor fremspiret græsukrudt skal bekæmpes, for at undgå udbredelsen af resistent enårig rapgræs overfor Hussar. Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge herbicid-resistens.

#### **Primera Super / Foxtrot**

Kan med 0,8 l pr. ha anvendes mod flyvehavre og agerrævehale frem til stadie 29.

#### **Udlæg i vintersæd**

##### **Opfølgende behandling i foråret**

Praktiseres stort set ikke længere på grund af væselhaleproblemer.

Mod mange burresnerre eller store kamiller kan om foråret suppleres med 0,75 l Zypar eller 0,75 l Starane XL pr. ha. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet til frøukrudt og tidsler.

Mod enårig rapgræs i vinterbyg kan Hussar OD med 0,025 l eller Hussar Plus OD med 0,035 l pr. ha + 0,5 l olie pr. ha anvendes. I vinterhvede kan doseringen øges til Hussar OD 0,05 l eller Hussar Plus OD 0,07 l pr. ha + olie. Hussar har effekt mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og tokimbladet ukrudt.

Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes Topik 0,4 l pr. ha frem til stadie 29 eller 0,8 l Primera Super pr. ha frem til stadie 39.