

## Etablering af hybrid rajgræs

FrøavlsINFO nr. 1, 2025

- **Udlæg af hybridrajgræs lykkes godt i en stråstiv vårbygssort**
- **Optimalt plantetal pr. m<sup>2</sup> i vårbyg: 250-275**
- **Bekæmp enårig rapgræs i forbindelse med såning**

Hybridrajgræs lægges normalt ud i dæksæd om foråret. En velegnet dæksæd er en kort stråstiv vårbygssort med lille tendens til strå- og aksnedknækning. Du kan finde bygsorternes egenskaber på [sortinfo](#)

Anvend gerne en maltbygssort, hvor der gødes moderat. Der tilstræbes et plantetal i vårbyg på 250 - 275 pl./m<sup>2</sup>, og man bør så vårbyggen med alle tragte, da der ellers kan være risiko for at græsset tager overhånd i forhold til dæksæden. Såning af udlæg skal ske samtidig eller straks efter såning af dæksæden.

Blandes græsfrøet med dæksæden, er det vigtigt ikke at så dybere end tre cm. Der anvendes 8-12 kg græsfrø pr. ha afhængig af sort, frøvægt og såbedets beskaffenhed. Højeste udsædsmængde i tetraploide sorter og laveste i diploide sorter.

Se sorterens egenskaber [her](#).

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

Sørg for at frøet bliver sået i jorden i 2 cm dybde. Etableringen er mere usikker, hvis frøet blot drysses ud oven på jorden med en frøsåkasse.

Hvis man alligevel anvender frøsåkasse, er det en fordel, at sårørene går ned foran tragtene. Dette gør, at frøene bliver bedre blandet op i den fugtige jord og placeres lidt dybere, end hvis det kun er efterharven, der dækker dem. Der bør tromles efterfølgende.

### Ukrudtsbehandling med DFF

En behandling med 0,1-0,15 l pr. ha DFF på fugtig jord, lige efter såning og tromling, har vist god effekt mod enårig rapgræs såvel som flere tokimbladede arter, som eksempelvis agerstedmoder, tvetand og ærenpris.

En korrekt såning, hvor frøene er dækket af 1-2 cm jord, er en forudsætning for anvendelse af DFF, da man ellers kan risikere at skade udlægget.

Hybridrajgræs egner sig, på grund af sin hurtige vækst, også godt til udlæg i renbestand fra slutningen af august til først i september.